

RS Nr. 1565  
BÖ/Ke  
Juli 2016

## Qualitative und ökonomische Wundversorgung

Sehr geehrte Frau Doktor,  
sehr geehrter Herr Doktor!

Der korrekte Einsatz von Wundversorgungsprodukten ist nicht nur qualitativ sondern auch ökonomisch sinnvoll. Wir haben Ihnen daher zu ausgewählten Wundversorgungsprodukten Vorschläge zusammengestellt, die Sie in Ihrer täglichen Praxis unterstützen sollen, konkret zu:

- **Silberprodukten (Aquacel Ag, Actisorb, SilverCell, PolyMem Silber) und**
- **Superabsorber Cutimed Sorbion Sacht S**


Bitte berücksichtigen Sie diese Tipps im Alltag, um weiterhin eine qualitative und ökonomische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.

**Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Stelle:**

DGKS ZWM Ute Atzmanning, E-Mail [ute.atzmanninger@oegkk.at](mailto:ute.atzmanninger@oegkk.at), Telefon 05 7807-102056.

Freundliche Grüße

**OÖ Gebietskrankenkasse**




Mag. Franz Kiesel, MPM  
Ressortdirektor

Ärztekammer für Oberösterreich



MR Dr. Wolfgang Ziegler  
*Kurienobmann-Stv.  
niedergelassene Ärzte*



OMR Dr. Thomas Fiedler  
*Kurienobmann  
niedergelassene Ärzte*



Dr. Peter Niedermoser  
*Präsident*

**P.S.:** Das Öko-Tool „Wundversorgung“ wird gemeinsam von der Ärztekammer OÖ und der OÖGKK finanziert und bereits seit Anfang des Jahres sukzessive in alle Arztsoftwares implementiert. Ihr Softwareanbieter bietet daher eine für Sie kostenlose Implementierung, monatliche Wartung und Anwenderunterstützung an.

Ergeht an: alle Allgemeinmediziner

## Tipps zum Einsatz von Silberprodukten und Cutimed Sorbion Sachet S

### **SILBERPRODUKTE** (z.B. Aquacel Ag, Actisorb, SilverCell, PolyMem Silber)

#### **Indikation für Silberprodukte:**

- Wundinfektionen
- In Ausnahmefällen bei Wunden mit hohem Infektions- oder Reinfektionsrisiko (z.B. bei Verbrennungen)

#### **Verordnungsmenge:**

- grundsätzlich max. zwei Verpackungseinheiten pro Patient und Wunde

Laut internationaler Konsensusempfehlung für „Adäquate Anwendung von Silberverbänden bei Wunden“ soll **nach zwei Wochen Erprobungsphase die Therapie evaluiert** werden:

- Gibt es nach Besserung der Wunde noch Infektionszeichen, ist eine Weiterverwendung des Silberverbandes möglich.
- Gibt es nach Besserung der Wunde keine Infektionszeichen mehr, ist der Silberverband abzusetzen.
- Gibt es keine Besserung, ist der Silberverband abzusetzen und ein anderes antimikrobielles Mittel bzw. systemische Antibiose zu verwenden.

#### **Wann sollten Silberverbände nicht verwendet werden:**

- Wenn keine Anzeichen einer lokalisierten Infektion vorliegen.
- Bei mangelnder Körperhygiene bzw. mangelnden hygienischen Verhältnissen im Umfeld des Patienten.
- Bei Vorliegen von Kontraindikationen (z.B. Überempfindlichkeit gegen Silber).

### **CUTIMED SORBION SACHET S** (ehemals Sorbion Sachet S)

#### **Indikation für Cutimed Sorbion Sachet S:**

- Stark exsudierende Wunden

Dieses Produkt gehört zu den Hochpreisprodukten in der Gruppe der Saugkompressen mit Superabsorber. Gegenüber den günstigeren Alternativprodukten in dieser Gruppe ist die etwas höhere Exsudataufnahme und das bessere Retentionsverhalten zu erwähnen. **In der Regel sind jedoch die günstigeren Alternativprodukte ausreichend** (z.B. Zetuvit plus, Relevo), vor allem beim täglich notwendigen Verbandswechsel (z.B. bei Infektion).

#### **Wann sollte Cutimed Sorbion Sachet S nicht verwendet werden:**

- Bei gering bis mäßig exsudierenden Wunden

**Wichtig:** Cutimed Sorbion Sachet S bitte nicht anfeuchten, um die Absorptionsfähigkeit zu beeinflussen. Es steht eine Reihe von passenden Produkten für gering oder mäßig exsudierende Wunden zur Verfügung (z.B. Saugkompressen beschichtet, Schaumstoffe, usw.).